

Rituximab para el tratamiento del síndrome nefrótico

Rituximab for Nephrotic Syndrome

El Rituximab es un medicamento que se utiliza para disminuir temporalmente la respuesta del sistema inmunológico. Se puede utilizar para tratar el síndrome nefrótico en niños que padecen de efectos secundarios como resultado de los esteroides.

¿Cómo funciona el Rituximab?

El Rituximab actúa bajando los niveles de células B del organismo. Las células B son las encargadas de luchar contra las infecciones.

¿Cómo debería tomar Rituximab? ¿Cómo se administra el Rituximab?

El Rituximab es un líquido que se administra lentamente por algunas horas vía intravenosa (IV) (en la vena) en un hospital.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del Rituximab?

El Rituximab puede causar algunas reacciones durante la administración del medicamento o al poco tiempo después. Estas reacciones se conocen como reacciones a la infusión. Usualmente se presentan con la primera o segunda dosis y son menos frecuentes con las dosis posteriores. Para ayudar a prevenir este tipo de reacción se administra acetaminofén (Tylenol) y difenhidramina (Benadryl) junto con el Rituximab. No obstante, informe al médico de inmediato si presentara una reacción durante la infusión y en el término de 24 horas después de la infusión como por ejemplo:

- Escalofríos, dolor de cabeza, fiebre, hinchazón de la lengua o la garganta o acaloramientos.
- Cansancio, dolores en las articulaciones o rigidez muscular, diarrea (heces sueltas o aguadas) o sudores nocturnos.
- Erupción, con o sin ampolladuras (en raras ocasiones se presentan algunas semanas después de la infusión)

La mayoría de los efectos secundarios a continuación no son comunes pero podrían ser señal de problemas graves. **Llame al médico** de inmediato o acuda a la sala de emergencias si presentara alguno de los siguientes efectos secundarios:

- Fiebre o escalofríos
- Tos o dolor de garganta
- Dolor abdominal o dolor estomacal
- Dolor en la parte baja de la espalda o a los lados
- Dolor en el pecho
- Hinchazón en la lengua o garganta, cara, manos o pies (LLAME AL 911)
- Problemas para respirar o tragar (LLAME AL 911)
- Aceleración o irregularidad del ritmo cardíaco
- Reacción cutánea grave tal como úlceras cutáneas o piel escamosa
- Sangre en la orina o las heces
- Moretones o sangrado inusuales
- Mareos, somnolencia

¿Qué medidas de seguridad debería tomar mientras uso Rituximab?

- Si tuviera que someterse a una intervención quirúrgica, un procedimiento dental o a un tratamiento de emergencia dentro del año que se le administró Rituximab infórmele al médico o al dentista que está bajo tratamiento con Rituximab.

- El Rituximab podría marearlo, hacerlo sentir somnoliento y menos alerta de lo normal. Preste especial atención cuando esté haciendo algo que necesita estar alerta como por ejemplo usar escaleras.
- Temporalmente el Rituximab puede disminuir la cantidad de glóbulos blancos en sangre lo que a su vez puede aumentar las probabilidades de infecciones.
- Mientras esté siendo tratado con Rituximab, no debería recibir ninguna vacuna sin el consentimiento del médico, en particular con vacunas "vivas" tales como la vacuna de la gripe, varicela o MMR
- La infección por hepatitis B podría empeorar durante el tratamiento con Rituximab por lo tanto debería hacerse un análisis de detección de hepatitis B antes de comenzar con el tratamiento con Rituximab
- Consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo luego de haber recibido el Rituximab

Translated by UNC Health Care Interpreter Services, 01/25/2017